

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

皮ふ炎・しっしん・かゆみ・おむつかぶれ

ロマーナクリーム

【非ステロイド性湿疹・皮ふ炎用薬】

ロマーナクリームは、非ステロイド性抗炎症剤ブフェキサマクを配合した、なめらかでのびのよいクリームで、あせも、ただれ、かゆみ、皮ふ炎、湿疹、おむつかぶれ等に効果を発揮する、肌にやさしい外用剤です。



使用上の注意



してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の部位には使用しないでください
目の周囲、粘膜等。



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 患部の湿潤やただれのひどい人、または化膿している人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、刺激感（ヒリヒリ感）

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
接触皮膚炎	塗布部に発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等があらわれ、これらの症状が全身に広がり、重症化することがある。

- (2) 1～2週間位使用しても症状がよくなりません、または本剤の使用により症状が悪化した場合。

〈効能・効果〉

湿疹、皮ふ炎、かゆみ、かぶれ、ただれ、おむつかぶれ、あせも、日焼けに伴うほてり・いたみ・かゆみ、虫さされ、しもやけ

〈用法・用量〉

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量をお守りください。

〈成分・分量〉100g中

ブフェキサマク……………5g
添加物：流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、セタノール、パラベン、グリセリン、オレイルアルコール、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸ポリオキシル

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限（外箱及びチューブに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東光薬品工業株式会社 お客様相談室 電話03-3855-0101
受付時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日を除く）

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号