

RAKCOOL

第2類医薬品

ジクロフェナクNa1%

ラクール 経皮鎮痛消炎剤 ラクペタンDX

液

容量 55mL

ラクール 経皮鎮痛消炎剤 ラクペタンDX

ゲル

容量 55g



広範囲に塗りやすい
液剤



塗りやすい
首曲がり容器



清涼感に
優れた
ゲル剤



やわらかく伸びやすい
ラミネートチューブ

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

- ・1日3~4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
- ・15歳未満の小児は使用しないでください。

【成分・分量】 1g中

ジクロフェナクナトリウム.....10mg
 添加物:ハアセチルしょ糖、エタノール、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピルセチルエーテル、*l*-メントール、エデト酸Na水和物

【注意】

1. 次の人は使用しないでください
 (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦または妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
 (1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品の投与を受けている人。 ニューキノロン系抗菌剤
4. ご使用に際し、説明書をよくお読みください
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
6. 小児の手の届かない所に保管してください
7. 火気に近づけないでください

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

- ・1日3~4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
- ・15歳未満の小児は使用しないでください。

【成分・分量】 1g中

ジクロフェナクナトリウム.....10mg
 添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピルセチルエーテル、ピロ亜硫酸Na、イソプロパノール、pH調節剤、*l*-メントール

【注意】

1. 次の人は使用しないでください
 (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦または妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
 (1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品の投与を受けている人。 ニューキノロン系抗菌剤
4. ご使用に際し、説明書をよくお読みください
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
6. 小児の手の届かない所に保管してください
7. 火気に近づけないでください

商品名	仕様	寸法(幅×奥行×高さmm)	重量	入り数	希望小売価格	JAN/ITFコード
ラクペタンDX液 55mL	個装箱	57× 36×133	約70g	55mL×1	1,480円 (税別)	4987435589118
	集合箱	186×117×137	約710g	55mL×1×10		_____
	流通箱	574×256×143	約4800g	55mL×1×10×6		14987435589115
ラクペタンDXゲル 55g	個装箱	48× 36×164	約74g	55g×1	1,480円 (税別)	4987435576118
	集合箱	188×100×168	約745g	55g×1×10		_____
	流通箱	395×321×187	約4900g	55g×1×10×6		14987435576115