第2類医薬品





ラクペタンDXテープ・ラクペタンDXテープL

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉 痛、腰痛、打撲、捻挫

流動パラフィン、イソステアリン酸、タルク、Qーメントール、BHT

【用法•用量】

○プラスチックフィルムをはがし、DXテープは1日1回1~2枚、DXテープLは1日1回1枚を 患部に貼付してください。ただし、DXテープは1回あたり2枚、DXテープLは1回あたり1枚 を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。 ○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2)1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに同じ患部に貼りかえる場合 は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから 使用してください
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の 症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安とし て半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用し てください。
- (6)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

ラクペタンDXパップ

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉 痛、腰痛、打撲、捻挫

膏体100g中 1枚10cm×14cm、膏体量14g

育体 100g年 1次 10cmス 14cm、日本生 176 ジクロフェナクナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・1g 添加物:BHT、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビ ール、グリセリン、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、酸化チタン、カオリン、エデト 酸Na水和物、pH調節剤、パラベン、N-メチル-2-ピロリドン、Q-メントール

【<mark>用法・用量】</mark> ○プラスチックフィルムをはがし、1日1回患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚 を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。 ○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに同じ患部に貼りかえる場合 は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから 使用してください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の 症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安とし て半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用し てください。
- (6)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

商品名	包 装	寸法(幅×高さ×奥行きmm)	重量	入り数	メーカー希望小売価格	JAN/ITFコード
ラクペタンDX テープ (21枚)	個装箱	148×160× 28	約99g	7枚×3袋入	1,980円(税別)	4987435575029
	流通箱	501×272×316	約5.5kg	個装箱48箱入		14987435575026
ラクペタンDX テープL (7枚)	個装箱	200×178× 24	約83g	7枚×1袋入	1,480円(税別)	4987435575524
	流通箱	554×132×423	約2.9kg	個装箱24箱入		14987435575521
ラクペタンDX パップ(7枚)	個装箱	207×160× 23	約165g	7枚×1袋入	1,480円(税別)	4987435574022
	オーバーラップ	207×207×160	約1.5kg	個装箱9箱入		
	流通箱	433×239×343	約6.7kg	個装箱36箱入		14987435574029

