

潤い成分がなめらかお肌へ

20%尿素 クリーム

カサカサお肌の
治療に

尿素20%
保湿成分


ビタミンE
血行促進成分

グリチルリチン酸
-アンモニウム
抗炎症成分


第3類医薬品

150g

尿素(保湿成分)の働きでしっとり
と、うるおいのある皮ふ



乾燥や肌荒れにより水分を保つ働
きが、低下してしまった皮ふ



●**効能**／手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

●**用法**／1日数回、適量を患部に塗擦してください
(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください(2)小児(15歳未満)には使用させないでください(3)外用にのみ使用してください

●**成分100g中**／尿素…20g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g、グリチルリチン酸-アンモニウム…0.5g
添加物:グリセリン、1,3-ブチレングリコール、スクワラン、セタノール、ステアリン酸、ベヘン酸、トリイソオクタン酸グリセリン、ジメチルポリシロキサン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシシル、pH調節剤、グリシン、エデト酸Na水和物、クエン酸Na水和物、パラベン

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3.2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931



ガサガサの手指に



コチコチのかかとに



黒ずんだひじ・ひざに

●保管および取り扱い上の注意／

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください(2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感が出ることがありますので、ご使用のつどキャップをしっかり閉めてください(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号

使用
期限

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号