

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠または妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください

4. 連続して2週間以上使用しないでください

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(2)他の医薬品を使用している人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(5)次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスボリン、選択的セトロニン再取り込み阻害剤 (7)高齢者。

2. 使用中または使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水泡、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、だだれ等の激しい皮ふ炎症や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。
-------------	--

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

[効能・効果] 関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

[用法・用量] ○プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

(1)定められた用法・用量をお守りください。(2)1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに同じ患部に貼りかかる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていなければ、そのまま貼り続けることができます。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

[成分・分量(膏体100g中)] 1枚10cm×14cm、膏体量1.5g

ジクロフェナコナトリウム……………2.0g θ-メントール……………3.5g

添加物: イソステアリン酸、BHT、スチレン、イソブレン、スチレンプロックコポリマー、テルペン樹脂、スクワラン、流動パラフィン

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)

〈お問い合わせ先〉

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡頂きますようお願い申しあげます。

ラクール薬品販売株式会社

フリーダイヤル 0120-86-8998

発売元

R ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

TOKO 東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号



4 987435 575579

→これを押して
開けてください。