

ナビーム 水虫プラスHT7

液

第2類医薬品

[効能・効果]
みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量]

1日1回、適量を患部に塗布してください。
※キャップを取り、容器の先端のノズルを患部に軽く押し当てて塗布してください。

<用法・用量に関する注意>
(1)定められた用法・用量をお守りください。

(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(3)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(5)外用にのみ使用してください。
(6)本剤のついた手で目や粘膜にふれないでください。

火気厳禁(第二石油類)
危険等級III(エタノール)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

塗布
瓶
新田
聯業

RAKOO

30mL

7の有効成分配合 水虫治療

液

殺真菌

(テルビナфин 塩酸塩)

1回1回で効く



ナビーム 水虫プラスHT7液

第2類医薬品

水虫・たむし
治療薬

[成分・分量] 1g中
テルビナフィン塩酸塩…10mg
リドカイン…20mg
ジフェニヒドラミン塩酸塩…5mg
グリチルレチン…5mg
イソプロピルメチルフェノール…3mg
クロタミトン…50mg
メントール…20mg
[添加物] エタノール、1,3-ブチレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調節剤、その他1成分

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない通気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤飲の原因になったり品質が変わることがあります)。

(4)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

(5)火気には近づけないでください。

(6)使用済み容器を火中に投じないでください。

(7)メガネ、時計、アクセサリー等

の金属類、化粧の衣類、プラス

チック類、床や家具などの壁装

面等に付着すると変質するこ

とがありますので、付着しない

よう注意してください。

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・はれ等)を起こしたことがある人

2.次の部位には使用しないでください
(1)目や耳の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、喉等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、癰裂や外傷のひどい部位。

[相談すること]

1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠または妊娠している可能性のある人。(3)乳幼児。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)皮膚が乾燥または広範囲の人。(6)皮部が化膿している人。(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、せにたむし」かがはつきりしない人。

(8)かゆみ・たむし・だだれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い)。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

[責任部位]

症 状

かぶれ、刺激感、熱感、銀屑(フケやアカのように皮丘が剥がれる)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの癢感、痛み、色素沈着、発疹・発赤、かゆみ・はれ、じんましん

*全身に発現することがあります。

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください



紙 税 控除 対象